



femibion® Natalcare I ФЕМІБІОН® НАТАЛКЕР I

Дієтична добавка

для жінок, які планують вагітність
та вагітним до кінця 12 тижня

ФОЛІЄВА КИСЛОТА + МЕТАФОЛИН®

Вітаміни та йод

Сучасні жінки часто харчуються нерегулярно і використовують різні дієти. Це призводить до того, що їх організм не отримує всіх необхідних вітамінів і мінералів. Напружена робота і прийом пероральної контрацепції можуть призводити до нестачі вітамінів з групи В та фолієвої кислоти.

Спосіб харчування жінки до вагітності, та під час вагітності особливо важливий, так як він впливає на здоров'я як матері, так і плоду.

Складові компоненти дієтичної добавки ФЕМІБІОН® НАТАЛКЕР I зміцнюють організм жінки і збагачують щоденну дієту вітамінами і мінеральними речовинами. Дієтична добавка ФЕМІБІОН® НАТАЛКЕР I – це комплекс 10 вітамінів і йоду.

Склад препарату був розроблений для жінок, які планують вагітність, та вагітних зі строком вагітності до кінця 12 тижня.

Підібрані належним чином

компоненти дієтичної добавки ФЕМІБІОН® НАТАЛКЕР I забезпечують основну порцію вітамінно-мінеральних добавок до щоденного раціону. Збільшена доза фолієвої кислоти в дієтичній добавці ФЕМІБІОН® НАТАЛКЕР I необхідна для регулювання різних метаболічних процесів.

Дієтична добавка Фемібіон® Наталкер I містить фолієву кислоту та МЕТАФОЛИН®.

В організмі фолієва кислота перетворюється в біологічно активну форму. Медичні дані свідчать, що організм кожної другої жінки не може повністю перетворити фолієву кислоту в її активну форму. МЕТАФОЛИН® - це біологічно активна форма фолатів, що легко засвоюється. Завдяки цьому МЕТАФОЛИН® для організму більш доступний і засвоюється краще, ніж фолієва кислота. Фемібіон® Наталкер I містить фолієву кислоту та МЕТАФОЛИН® для забезпечення необхідного рівня фолатів в організмі вагітної жінки, навіть у тих жінок, організм яких не може повністю перетворити, і як наслідок, засвоїти фолієву

кислоту.

Прийом фолієвої кислоти та її активної форми МЕТАФОЛИН®, жінкам, які планують вагітність, рекомендується починати мінімум за 6 тижнів, і продовжувати до кінця другого триместру вагітності. У годуючих грудьми жінок потреба в фолієвій кислоті вище. Після чотирьох місяців дефіциту фолієвої кислоти в дієті спостерігається виснаження її запасів в організмі.

Під час вагітності збільшується потреба у йоді, в основному в першому триместрі, до близько 200 мікрограмів на добу. Йод проникає також у грудне молоко матері, збільшуючи його втрату з організму. Правильне добове споживання йоду необхідно забезпечити прийомом препаратів йодистого калію в кількості 150 мкг для вагітних і годуючих грудьми.

Рекомендації до споживання: може бути включена до складу раціонів дієтичного харчування, рекомендованих лікарем, з метою оптимізації хімічного складу раціону як додаткове джерело фолієвої кислоти, вітамінів В1, В2, В6, В12, С, Е, біотину, нікотинамідю,

пантотенової кислоти, йоду.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.

Продукт не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування!

Містить мальтодекстрин.

Не є лікарським засобом.

Без ГМО.

Спосіб вживання: жінкам по 1 таблетці на день під час основного прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю води.

Термін вживання: рекомендовано для плануючих вагітність, та вагітним до кінця дванадцятого тижня, споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем.

Застереження при споживанні: індивідуальна чутливість до компонентів продукту. Не вживати пацієнтам з проявами гіпертиреозу, глюкозо-галактозної мальабсорбції та сахарозо-ізомальтазного дефіциту. Не перевищувати рекомендовану добову дозу.





Склад: 1 таблетка (610 мг) містить *активні інгредієнти*:

склад 1 таблетки	кількість в 1 таблетці	%RI* на таблетку	кількість на 100 г	%RI* на 100 г
Вітамін С	110 мг	138 %	18 042 мг	22 635 %
Нікотинамід (NE) ¹	15 мг	94 %	2 460 мг	15 418 %
Вітамін Е (α-ТЕ) ²	13 мг	108 %	2 132 мг	17 714 %
Пантотенова кислота	6 мг	100 %	984 мг	16 402 %
Вітамін В6	1,9 мг	136 %	312 мг	22 307%
Вітамін В2	1,6 мг	114 %	262 мг	18 698 %
Вітамін В1	1,2 мг	109 %	197 мг	17 878 %
Фолати	400 мкг	200 %	65 608 мкг	32 804 %
• Фолієва кислота	• 200 мкг	• 100 %	32 804 мкг	16 402 %
• Кальцій-L-Метилфолат (МЕТАФОЛІН®/ Metafolin®)	• 208 мкг (еквівалентно 200 мкг фолієвої кислоти)	• 100 %	34 116 мкг	16 402 %
Йод Біотин	150 мкг	100 %	24 603 мкг	16 402 %
Вітамін В12	60 мкг	120 %	9 841 мкг	19 682 %
	3,5 мкг	140 %	574 мкг	22 963 %

* відсоток від рекомендованої добової дози згідно Регламенту ЄС № 1169/2011

¹ Еквівалент ніацину

² Еквівалент RRR-альфа-токоферолу

інгредієнти: Наповнювач: Мікрокристалічна целюлоза; Кальцій-L-аскорбінова кислота (Вітамін С); D, L-альфа-токоферолу ацетат (Вітамін Е) (Мальтодекстрин, Модифікований крохмаль); Наповнювач: Гідроксипропілцелюлоза; Нікотинамід; Глазуриувачі: Гідроксипропілцелюлоза, Гідроксипропілметилцелюлоза; Кальцій-D-пантотенат; D-Біотин (Мальтодекстрин); Барвник: Титану діоксид; Ціанокобаламін (Вітамін В12) (Мальтодекстрин); Агент, що протидіє злипанню: Магнієві солі жирних кислот; Піридоксину гідрохлорид (Вітамін В6); Рибофлавін (Вітамін В2); Тіаміну мононітрат (Вітамін В1); Зволожувач: Гліцерин; Кальцій-L-Метилфолат (МЕТАФОЛІН®/ Metafolin®); Фолієва кислота; Калій йодид; Барвник: Заліза оксид.

Поживна цінність на 1 таблетку: Енергетична цінність 4 кДж/1 ккал
Жири < 0.5 г, у т.ч. насичені < 0,1 г, Вуглеводи < 0.5 г.



Форма випуску: 30 таблеток, вкритих оболонкою, 1 блістер в картонній упаковці.

Умови зберігання: зберігати при температурі до 25°C, в захищеному від вологи та недоступному для дітей місці.

Строк придатності: 24 місяці від дати виготовлення.

Дата виробництва та (або) кінцевий термін придатності, номер серії приведені на упаковці.

Штрих код: вказаний на упаковці.

Виробник: Мерк КГаА і Ко. Верк Шпіталь, Австрія, Хосслгасе 20, 9800 Шпіталь/Драу, Австрія / Merck KGaA & Co. Werk Spittal, Austria, Hoesslgasse 20, 9800 Spittal/Drau, Austria



Ексклюзивний представник в Україні: ТОВ «Др. Редді'с Лабораторізі» ("LLC Dr. Reddy's Laboratories"), юридична адреса: вул. Київський шлях, 121-А, с. Велика Олександрівка, Бориспільський ра-н. Київська обл., Україна 08320, тел.: +38 044 492-31-73/факс: +38 044 492-31-74



3.39000.5195/UKR 87.435.1291

Femibion 1 - Product information leaflet

Ukraine

Modification:	Text changes. New logo		
Techn. layout ref.:	87435.1291 / 155 x 210 mm	Reference-No. MSM:	3.39000.5195/UKR
Font: Var. Data /Prod. text	n.a. / Myriad Pro ≥ 8 pt	Article-No. MSM:	2732
Program:	Illustrator CC 2017	ERP comp. code Merck:	3390005195
Packaging site:	Merck Spittal	ERP prod. code Merck:	3.02732.0751
Laetus code:	19434 - 112 122 222 121 22	Spotmark:	n/a
Printing colours:	Pantone 2607 C. 		
Non printing colours:	Keyline. 		
Designed by: S_170906	SATZTEAM · Mrs. Milicevic/Mr. Meyer · Max-Eyth-Straße 8 · D-71735 Eberdingen-Hochdorf Phone +49 7042 78007 · Fax +49 7042 78877 · mail@satzteam.de · #101332		
Release MSM:	Approved by		
Release LRA:	Approved by		
Release Technique:	Approved by		
Version:	21/09/17		

The provided file was edited with the utmost care and evaluated internally after completion. Nevertheless every attempt of editing a file involves a high degree of risk. **Therefore we would like to ask you to review the PDF file/proof thoroughly.** We cannot accept any liability for errors recognized after approval.
sincerely yours SATZTEAM

INFO: Position
Frontpage/Backpage

